



Eerste hulp bij vergiftiging door inbrekers:

- **Gebruikte vergif is** meestal furodan (donker paarse korrels)
- Er is geen volledig antigif tegen furodan beschikbaar
- De giftigheid hangt af van de hoeveelheid ingenomen gif

1. haal alle honden van het erf (er kan meer gif liggen)

2 . laat de hond braken : dat kan door

* waterstofperoxide 1:3 verdunnen en daarvan 1á2 eetlepels per 10 kg lichaamsgewicht geven. Als de hond niet binnen een kwartier braakt mag het herhaald worden

*mosterd : 2 theelepels in een cup lauw water

Gebruik liever **géén** zout, het succes van braken door zout is wisselvallig en honden kunnen slecht tegen zout. Soms overleeft de hond een furodan vergiftiging en gaat daarna dood aan een zout vergiftiging. Als er echt niets anders voorradig is : geef dan ½ theelepel zout achter op de tong

Waarschuwing : alléén laten braken als de hond bij is.

Als hij ligt (en spartelt) niet meer.

3. bel ondertussen de dierenarts of de wacht dierenarts (in het weekend).

Deze kan de hond laten braken als het zo niet lukt,

kan de hond antigif geven, spierontspanners en infuus indien nodig.

Vul hier het spoednummer van uw eigen dierenarts in:

Of bel naar de weekenddienstlijn 148

Als de hond over het ergste van de vergiftiging heen lijkt te zijn kan hij norit tabletten krijgen.

Veel laten drinken !!!